

VERIFICA E APPROVAZIONE			
Revisione	Data	Funzione	Visto
0	Ottobre 2021	Direttore UOC Microbiologia e Responsabile Laboratorio Analisi Direttore UOC Anatomia Patologica	Dr. Pierangelo Clerici Dr. Paolo Fociani
1	febbraio 2025	Direttore ff SC Microbiologia Direttore SC Laboratorio Analisi	Dr.ssa Bianca Osnaghi Dr. Sergio Finazzi
2	23 Marzo 2026	Direttore SC Microbiologia Direttore SC Laboratorio Analisi	Dr. A. Colombo Dr. S. Finazzi

أنواع اختبارات السائل المنوي

➔ زرع السائل المنوي أو زرع الحيوانات المنوية

1. تجنب تناول المضادات الحيوية لمدة 5 أيام على الأقل قبل الاختبار.
2. قم بإجراء عملية التجميع في الصباح باستخدام الحاوية المعقمة.
3. بعد التبول، اغسل يديك وأعضائك التناسلية الخارجية جيدًا بالماء والصابون ثم اشطفها جيدًا بالماء.
4. قم بجمع السائل المنوي عن طريق الاستمنااء مباشرة في الحاوية وقم بتسليمه خلال ساعتين من الجمع، وإلا قم بتخزين العينة في الثلاجة.
5. يُنصح بالامتناع عن ممارسة الجنس لمدة 24 ساعة قبل الاختبار.

➔ السائل المنوي والبول (اختبار ستامي)

1. تجنب تناول المضادات الحيوية لمدة 5 أيام على الأقل قبل الاختبار.
2. اغسل الأعضاء التناسلية الخارجية جيدًا بالماء والصابون ثم اشطفها جيدًا بالماء.
3. يتم توفير 4 حاويات كبيرة و 3 أنابيب اختبار، وكلها مرقمة.
قم بإجراء التجميع في الصباح:
- قم بجمع أول دفعة من البول في الحاوية الكبيرة رقم 1؛
- توقف عن التبول ومعاودة التبول في الحاوية الكبيرة رقم 2؛
- قم بجمع السائل المنوي عن طريق الاستمنااء في الحاوية الكبيرة رقم 3؛
- بعد جمع السائل المنوي، قم بجمع عينة أخرى من البول في الحاوية الكبيرة رقم 4؛
- استعادة البول الذي تم جمعه في الحاويات الكبيرة 1 و 2 و 4 عن طريق الشفط إلى أنابيب الاختبار بالعدد المقابل؛
- يجب التخلص من الحاويات الكبيرة 1 و 2 و 4 بعد الاستخدام. قم بتسليم أنابيب الاختبار فقط؛
- قم بتسليم الحاوية الكبيرة رقم 3 مغلقة ومُسمّاة.
4. قم بالتسليم خلال ساعتين من التجميع، وإلا قم بتخزين العينات في الثلاجة.
5. يُنصح بالامتناع عن ممارسة الجنس لمدة 24 ساعة قبل الاختبار.

➔ مخطط الحيوانات المنوية

1. الالتزام بفترة الامتناع عن ممارسة الجنس (الجماع الكامل والاستمنااء) لمدة لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد عن 5 أيام قبل موعد الاختبار.
2. يجب الإبلاغ عن عدد أيام الامتناع عند تسليم المادة.
3. إذا تم تناول المضادات الحيوية أو حدثت نوبات حمى كبيرة (حمى أعلى من 38+ درجة مئوية لأكثر من ثلاثة أيام متتالية) في الشهر الذي سبق يوم جمع العينة، فمن المستحسن تأجيل إجراء تحليل السائل المنوي.
4. قم بجمع السائل المنوي عن طريق الاستمنااء، مباشرة في الحاوية المعقمة المقدمة. اكتب اسمك ولقبك على الحاوية. يجب الإبلاغ عن وقت التجميع عند تسليم المواد.
5. تأكد من إنتهاء كل القذف في الحاوية، ومن المهم جدًا أن تكون عملية التجميع كاملة.
6. يمكن أن يتم التجميع في الموقع أو في المنزل. في حالة إجراء الاختبار في المنزل، يجب حماية العينة من البرد أثناء النقل (يفضل باستخدام القطن) وإبعادها عن مصادر الحرارة.
7. قم بتسليم العينة خلال 45 دقيقة من جمعها، مع استكمال شهادة 72MUC الذاتية.