

米兰西医疗机构 成像服务和诊断科	关于采血准备和 采集其他生物材料的 信息	MAC221 第 1 / 2 页
----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

修订	日期	核实与批准	
2	23 Marzo 2026	职务	姓名
		微生物学综合科代理主任 实验室分析综合科主任 免疫血液学综合科和输血中心主任	Alberto Colombo 医生 Sergio Finazzi 医生 Irene Cuppari 医生

采血准备 使用拭子对生物材料进行取样，以进行培养和真菌学检查的类型 尿结石采集
--

❑ 采血

1. 禁食至少 12 个小时。
2. 药物必须在采血后服用（除非处方医生另有规定）。

❑ 咽拭子

1. 检查前至少五天内不要服用抗生素。
2. 禁食 12 个小时。
3. 检查当天不要使用牙膏或漱口水。

❑ 对多部位拭子进行培养试验
（皮肤、眼部、耳廓、口腔、肛周、各种渗出物）

1. 检查前至少五天内不要服用抗生素。
2. 检查当天，不要对取样部位进行包扎、清洗或消毒。

❑ 尿道拭子（女性）、阴道拭子、宫颈拭子、外阴拭子、阴道-直肠拭子

1. 检查不能在月经期间进行。
2. 检查前五天内不要服用抗生素和抗真菌药。
3. 检查前 24 小时内，不要进行体内或体外抗生素和/或消毒剂清洗。
4. 建议在检查前 24 小时内避免发生性行为。

❑ 尿道拭子（男性）

1. 建议在膀胱充盈（憋尿至少 2 小时）的情况下进行拭子采样。
2. 检查前五天内不要服用抗生素和抗真菌药。
3. 用肥皂和水清洗外生殖器，并用大量清水冲洗。
4. 建议在检查前 24 小时内避免发生性行为。

❑ 真菌学检查

1. 检查前至少 7 天内不要服用抗真菌药物。

<div>米兰西医疗机构</div> <div>成像服务和诊断科</div>	<div>关于采血准备和</div> <div>采集其他生物材料的</div> <div>信息</div>	<div>MAC221</div> <div>第 2 / 2 页</div>
--	---	--

- 2. 去除指甲油。
- 3. 检查当天，不要对取样部位进行包扎、清洗或消毒。

☐ 痰培养检查

- 1. 建议在早晨空腹时收集第一次痰液。
- 2. 如果有活动假牙，请取下假牙；用水清洁口腔，尽量去除唾液。
- 3. 把痰咳入无菌容器中。必须收集痰液而不是唾液。
- 4. 在采集后的几小时内送交样本。
- 5. 如果检查需要一个以上的样本，请在连续的几天内采集，并按步骤 4 中的方法送交每个样本。

☐ 科赫杆菌（分枝杆菌）检查

- 1. 用水漱口，清洁口腔，尽可能多地清除唾液
- 2. 早晨采集样本，通过咳嗽排出深处的痰。
- 3. 吐到旋盖试管中。必须收集痰液而不是唾液
- 4. 在采集后的几小时内送交样本
- 5. 如果检查需要一个以上的样本，请在连续的几天内采集，并按步骤 4 中的方法送交每个样本。

☐ 尿结石采集

- 1. 将结石与尿液分开，收集在提供的容器中，或其他干净的容器中。
- 2. 在第一个工作日送交样本，样品存放在室温下，远离热源。